



JANÚAR

					1 FÖS <i>Nýársdagur</i>	2 LAU
3 SUN	4 MÁN	5 ÞRI	6 MIÐ <i>Þrettándinn</i>	7 FIM	8 FÖS	9 LAU
10 SUN	11 MÁN	12 ÞRI	13 MIÐ	14 FIM	15 FÖS	16 LAU
17 SUN	18 MÁN	19 ÞRI	20 MIÐ	21 FIM	22 FÖS <i>Bóndadagur</i>	23 LAU
24 SUN	25 MÁN	26 ÞRI	27 MIÐ	28 FIM	29 FÖS	30 LAU
31 SUN						

BARRVÖNDUR

Clavulina rugosa

Sveppur mánaðarins var myndaður á Mógilsá.

Barrvöndur er kóralsveppur sem myndar útræna svepprót með trjám, ofast barrtrjám en stundum með lauftrjám. Hann er ætur, en ekki sérlega ljúffengur.





FEBRÚAR

	1 MÁN	2 ÞRI	3 MIÐ	4 FIM	5 FÖS	6 LAU
7 SUN	8 MÁN	9 ÞRI	10 MIÐ	11 FIM	12 FÖS	13 LAU
14 SUN	15 MÁN <i>Bolludagur</i>	16 ÞRI <i>Sprengidagur</i>	17 MIÐ <i>Óskudagur</i>	18 FIM	19 FÖS	20 LAU
21 SUN <i>Könudagur</i>	22 MÁN	23 ÞRI	24 MIÐ	25 FIM	26 FÖS	27 LAU
28 SUN						

FÍSISVEPPUR

Lycoperdon sp.

Sveppur mánaðarins var myndaður í Öskjuhlíð.

Físisbelgir eru peru- eða stautlaga belgsveppir sem vaxa í skóg- og mólendi. Oft er erfitt að greina á milli tegunda. Fullþroskuð aldin eru opin í toppinn og spúa skýi af gróum út í loftið við minnsta hjask.

 skógræktin
skogur.is



MARS

	1 MÁN	2 ÞRI	3 MIÐ	4 FIM	5 FÖS	6 LAU 
7 SUN	8 MÁN	9 ÞRI	10 MIÐ	11 FIM	12 FÖS	13 LAU 
14 SUN	15 MÁN	16 ÞRI	17 MIÐ	18 FIM	19 FÖS	20 LAU <i>Vorjafndegur</i>
21 SUN  <i>Alþjóðlegur dagur skóga</i>	22 MÁN	23 ÞRI	24 MIÐ	25 FIM	26 FÖS	27 LAU
28 SUN  <i>Pálmasunnudagur</i>	29 MÁN	30 ÞRI	31 MIÐ			

STÍGTUBBA

Tubaria furfuracea

Sveppur mánaðarins var myndaður á Mógilsá.

Stígtubba er fansveppur sem vex í þyrpingum á sprekum og stubbum eða í viðarkurli. Hún er mest áberandi eftir rigningartíð síðsumars og á haustin. Óætt.

 skógræktin
skogur.is



APRÍL

				1 FIM <i>Skírdagur</i>	2 FÖS <i>Föstudagurinn langi</i>	3 LAU
4 SUN <i>Páskadagur</i>	5 MÁN <i>Annar í páskum</i>	6 ÞRI	7 MIÐ	8 FIM	9 FÖS	10 LAU
11 SUN	12 MÁN	13 ÞRI	14 MIÐ	15 FIM	16 FÖS	17 LAU
18 SUN	19 MÁN	20 ÞRI	21 MIÐ	22 FIM <i>Sumardagurinn fyrsti</i>	23 FÖS	24 LAU
25 SUN	26 MÁN	27 ÞRI	28 MIÐ	29 FIM	30 FÖS	

GULEGGJAHELMA

Mycena citrinomarginata

Sveppur mánaðarins er myndaður á Sauðási, Heiðmörk

Breytileg tegund sem er algeng í birki- og blandskógum um allt land. Óæt.





MAÍ

						1 LAU <i>Verkalýðsdagurinn</i>
2 SUN	3 MÁN	4 ÞRI	5 MIÐ	6 FIM	7 FÖS	8 LAU
9 SUN <i>Mæðradagurinn</i>	10 MÁN	11 ÞRI	12 MIÐ	13 FIM <i>Uppstigningardagur</i>	14 FÖS	15 LAU
16 SUN	17 MÁN	18 ÞRI	19 MIÐ	20 FIM	21 FÖS	22 LAU
23 SUN <i>Hvítasunnudagur</i>	24 MÁN <i>Annar í hvítasunu</i>	25 ÞRI	26 MIÐ	27 FIM	28 FÖS	29 LAU
30 SUN	31 MÁN					

GULLSKJÁLÍANDI

Tremella mesenterica

Sveppur mánaðarins var myndaður í Svartaskógi, Fossvogsdal.

Gullskjálíandi er hlaupsveppur sem sníkir á fúasveppum af ættkvíslinni *Peniophora*. Hann er algengur á rotandi við lauftrjáa og finnst hérlandis árið um kring. Óætur.





JÚNÍ

		1 ÞRI	2 MIÐ	3 FIM	4 FÖS	5 LAU
6 SUN <i>Sjómanna dagurinn</i>	7 MÁN	8 ÞRI	9 MIÐ	10 FIM	11 FÖS	12 LAU
13 SUN	14 MÁN	15 ÞRI	16 MIÐ	17 FIM <i>Ljóðveldisdagurinn</i>	18 FÖS	19 LAU
20 SUN	21 MÁN <i>Sumarsólstöður</i>	22 ÞRI	23 MIÐ	24 FIM <i>Jónsmessa</i>	25 FÖS	26 LAU
27 SUN	28 MÁN	29 ÞRI	30 MIÐ			

TEYGJUHELMA

Mycena epipterygia

Sveppur mánaðarins var myndaður á Mógilsá.

Teygjuhelma vex yfirleitt í djúpum mosa í skógum, votlendi, og lyngmóum. Mest áberandi í ágúst og september. Þó teygjuhelman sé breytileg, er auðvelt að þekkja hana frá öðrum helmum á slímugum, gulum stafnum. Óæt.

 skógræktin
skogur.is



JÚLÍ

				1 FIM	2 FÖS	3 LAU
4 SUN	5 MÁN	6 ÞRI	7 MIÐ	8 FIM	9 FÖS	10 LAU
11 SUN	12 MÁN	13 ÞRI	14 MIÐ	15 FIM	16 FÖS	17 LAU
18 SUN	19 MÁN	20 ÞRI	21 MIÐ	22 FIM	23 FÖS	24 LAU
25 SUN	26 MÁN	27 ÞRI	28 MIÐ	29 FIM	30 FÖS	31 LAU

NAFLATOPPA

Chromoseira citrinopallida

Sveppur mánaðarins var myndaður í Hamrahlíð, Úlfarsfelli.

Naflatoppa vex á mosagrónum skógarbotni víða um land. Sunnar í Evrópu er hún sjaldgæf og finnst einungis til fjalla, í snjódældum, á lyngheiðum og í graslendi, oft í djúpum mosa.





ÁGÚST

1 SUN	2 MÁN <i>Fridagur versunarmanna</i>	3 ÞRI	4 MIÐ	5 FIM	6 FÖS	7 LAU
8 SUN	9 MÁN	10 ÞRI	11 MIÐ	12 FIM	13 FÖS	14 LAU
15 SUN	16 MÁN	17 ÞRI	18 MIÐ	19 FIM	20 FÖS	21 LAU
22 SUN	23 MÁN	24 ÞRI	25 MIÐ	26 FIM	27 FÖS	28 LAU
29 SUN	30 MÁN	31 ÞRI				

FLIPASNUBBA

Hohenbuehelia petaloïdes

Sveppur mánaðarins var myndaður í Hólavallagarði.

Flipasnubba finnst einungis í Hólavallagarði þar sem hún vex á rotnandi víðarleifum. Sérhæfðar frumur í sveppþráðum og á faneggjum fanga og leysa upp þráðorma sem eru algengir í jarðvegi. Flipasnubban er æt en ekki eftirsótt sem matsveppur.





SEPTEMBER

			1 MIÐ	2 FIM	3 FÖS	4 LAU
5 SUN	6 MÁN	7 ÞRI	8 MIÐ	9 FIM	10 FÖS	11 LAU
12 SUN	13 MÁN	14 ÞRI	15 MIÐ	16 FIM <i>Dagur íslenskrar náttúru</i>	17 FÖS	18 LAU
19 SUN	20 MÁN	21 ÞRI	22 MIÐ <i>Hausjafndægur</i>	23 FIM	24 FÖS	25 LAU
26 SUN	27 MÁN	28 ÞRI	29 MIÐ	30 FIM		


PLÓMUSVEPPUR

Tricholomopsis rutilans





Sveppur mánaðarins var myndaður við Rauðavatn

Plómusveppur er óætur rotsveppur sem vex upp af dauðum barrviði, yfirleitt rötum eða öðrum viði undir yfirborðinu. Hann er sjaldgæfur hérlendis, en virðist vera að breiðast út á höfuðborgarsvæðinu.





OKTÓBER

					1 FÖS	2 LAU
3 SUN	4 MÁN	5 ÞRI	6 MIÐ 	7 FIM	8 FÖS	9 LAU
10 SUN	11 MÁN	12 ÞRI	13 MIÐ 	14 FIM	15 FÖS	16 LAU
17 SUN	18 MÁN	19 ÞRI	20 MIÐ 	21 FIM	22 FÖS	23 LAU <i>Fyrsti vetrardagur</i>
24 SUN	25 MÁN	26 ÞRI	27 MIÐ	28 FIM 	29 FÖS	30 LAU
31 SUN						

PÍPUKLUBBA

Macrotyphula fistulosa

Sveppur mánaðarins var myndaður á Mógilsá.

Pípuklubba er kylfusveppur sem vex í gisnum þyrpingum á rotandi laufi og fúnum sprekkum í lauf- og blandskógum. Sjaldgæf héraendis. Finnst oftast mjög síðla hausts eða snemma veturs.



NÓVEMBER

	1 MÁN	2 ÞRI	3 MIÐ	4 FIM	5 FÖS	6 LAU
7 SUN	8 MÁN	9 ÞRI	10 MIÐ	11 FIM	12 FÖS	13 LAU
14 SUN <i>Fedradagurinn</i>	15 MÁN	16 ÞRI <i>Dagur íslenskrar tungu</i>	17 MIÐ	18 FIM	19 FÖS	20 LAU
21 SUN	22 MÁN	23 ÞRI	24 MIÐ	25 FIM	26 FÖS	27 LAU
28 SUN	29 MÁN	30 ÞRI				

VÆNGLINGUR

Panellus mitis

Sveppur mánaðarins var myndaður í Hamrahlíð, Úlfarsfelli.

Vænglingur er lítill rotsveppur sem vex á dauðum barrviði. Hann er að breiðast út hérlendis og er mest áberandi seint á haustin og fyrri part vetrar. Í Svíþjóð er hann tengdur vetrinum og kallaður „vintermussling“. Óætur.





DESEMBER

			1 MID <i>Fullveldisdagurinn</i>	2 FIM	3 FÖS	4 LAU
5 SUN	6 MÁN	7 ÞRI	8 MID	9 FIM	10 FÖS	11 LAU
12 SUN	13 MÁN	14 ÞRI	15 MID	16 FIM	17 FÖS	18 LAU
19 SUN	20 MÁN	21 ÞRI <i>Vetrarsólstöður</i>	22 MID	23 FIM	24 FÖS <i>Aðfangadagur</i>	25 LAU <i>Jóladagur</i>
26 SUN <i>Annar í jólum</i>	27 MÁN	28 ÞRI	29 MID	30 FIM	31 FÖS <i>Gamlársdagur</i>	

BERSERKUR

Amanita muscaria

Sveppur mánaðarins var myndaður í Vífilstaðahlíð.

Berserkur er einn þekktasti eitursveppurinn í íslensku náttúru. Hann birtist eftir rigningartíð í ágúst og september. Eftirlíkingar hans eru notaðar sem jólaþekkingar.

